BIHAR BOARD CLASS -12

2022

MATHEMATICS

समय: 3 घंटे 5 मिनट]

[पूर्णांक : 100

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश:

- 1. परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक (10 अंकों का) अवश्य लिखें।
- 2. परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें।
- 3. दाहिनी ओर हाशिये पर दिये हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं।
- 4. इस प्रश्न-पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है।
- 5. यह प्रश्न-पत्र दो खंडों में है-खण्ड-अ एवं खण्ड-ब
- 6. खण्ड-अ में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं , जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। 50 प्रश्नों से अधिक का उत्तर देने पर प्रथम 50 का ही मूल्यांकन होगा। प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है। इनका उत्तर देने के लिए उपलब्ध कराये गये OMR उत्तर-पत्रक में दिए गए सही विकल्प को काले/ नीले बाॅल पेन से प्रगाढ़ करें। किसी भी प्रकार के व्हाइटनर/ तरल पदार्थ/ब्लेड / नाखून आदि का OMR उत्तर पत्रक में प्रयोग करना मना है, अन्याथा परीक्षा परिणाम अमान्य होगा।
- 7. खण्ड-ब में 30 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है, जिनमें से किसी 15 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। इनके अतिरिक्त इस खण्ड में 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिये गये हैं, प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित है, जिनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है।
- 8. किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग पूर्णतया वर्जित है।

खण्ड-अ (वस्तुनिष्ठ प्रश्न)

प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ चार विकल्प दिये गये हैं , जिनमें से एक सही है। किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर दें। अपने द्वारा चुने गये सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें।

3 विक.

4) x = y + c(B) xy = c(C) x + y = c(D) $x = y^2 + c$ 1. अवकल समीकरण xdy + ydx = 0 का हल है

$$2. \int \frac{dx}{x^2 - 1} =$$

(A)
$$\sin^{-1} x + k$$

(B)
$$\frac{1}{2} \log \left| \frac{x-1}{x+1} \right| + k$$

(C)
$$\frac{1}{2} \log \left| \frac{x+1}{x-1} \right| + k$$

(D)
$$\sqrt{1-x^2+k}$$

3.
$$\int \frac{dx}{x^2+4} =$$

(A)
$$\frac{1}{2}\sin^{-1}\frac{x}{2} + k$$

(B)
$$\frac{1}{2}\cos^{-1}\frac{x}{2} + k$$

(C)
$$\frac{1}{2} \tan^{-1} \frac{x}{2} + k$$

(D)
$$\tan^{-1} x + k$$

4.
$$2\vec{i}. 3\vec{j} =$$

(A)
$$6\vec{k}$$

- (C) 0
- (D) 1
- 5. $3\vec{j}$. $2\vec{k} =$
- (A) 6
- (B) 1
- (C) $6\vec{k}$
- (D) 0
- 6. $(3\vec{i} + 4\vec{j} 5\vec{k}) \cdot \vec{i} =$
- (A) 7
- (B) 3
- (C) 2
- (D) 0
- Bihanbana i = Com 7. $(\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}) \cdot (2\vec{i} + 3\vec{j} =$
- (A) 5
- (B) 6
- (C) 1
- (D) 11
- 8. $l2\vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k}l =$
- (A) 3
- (B) 5
- (C) 2
- (D) 1

- 9. $\int_0^1 \frac{\tan^1 x}{1+x^2} dx =$
- (A) $\frac{\pi^2}{8}$
- (B) $\frac{\pi^2}{12}$
- (C) $\frac{\pi^2}{16}$
- (D) $\frac{\pi^2}{32}$

10. यदि $\vec{a} = \vec{\imath} + 2\vec{\jmath}$ तथा $\vec{b} = 2\vec{\imath} + \vec{\jmath}$ तो $|\vec{a} + \vec{b}|$ का मान है

- (A) √2
- (B) $2\sqrt{2}$
- (C) $3\sqrt{2}$
- (D) $4\sqrt{3}$

11. निम्नलिखित में कौन सममित आव्यूह है?

(A)
$$\begin{bmatrix} -1 & 2 & -2 \\ -2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

- (B) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$
- (C) $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$
- (D) इनमे से कोई नहीं

12. यदि दो घटनाएँ A और B इस प्रकार हों कि P(A) ≠ 0 तथा P(B/A) = 1 तो

Jogo Con

- (A) $A \subset B$
- (B) B \subset A
- (C) $B = \phi$
- (D) $A = \phi$

- 13. $\sin^{-1}\frac{3}{5} + \sin^{-1}\frac{12}{13} =$
- (A) $\sin^{-1}\frac{36}{65}$
- (B) $\sin^{-1}\frac{63}{65}$
- (C) $\frac{\pi}{2}$

 $14. \int_{\pi/2}^{\pi/2} \sin^2 x \, dx =$ '4) 0 15. एक सिक्के को 10 बार उछाला जाता है। ठीक छ: चित आने की प्रायिकता है POOP COM

- (A) $10_{C_6} \left(\frac{1}{2}\right)^6$
- (B) $10_{C_6} \left(\frac{1}{2}\right)^7$
- (C) $10_{C_6} \left(\frac{1}{2}\right)^8$
- (D) $10_{C_6} \left(\frac{1}{2}\right)^{10}$

16. x-अक्ष की दिक कोज्याओ का योग है

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4

17. समतल 2x + y = z = 5 द्वारा x-, y- तथा z-अक्ष पर काटे गए अंत:खंड क्रमश:

- (A) $\frac{2}{5}, \frac{1}{5}, \frac{-1}{5}$
- (B) $\frac{5}{2}$, 5,5
- (C) $\frac{5}{2}$, 5, -5
- (D) 2, 1, -1

18. व्यवरोधों x + y ≤ 5, x ≥ 0, y ≥ 0 के अंतर्गत z = 2x - 3y का न्यूनतम मान है
(A) 0
(B) 10
(C) -15
(D) 20

19. बिन्दु (2, -3, -1) से ताल 2x - 3y + 6z + 7 = 0की दूरी है OOA COM

- (A) 2
- (B) 3
- (C) 6
- (D) 7

20. अवकल समीकरण $\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^3 + 2\left(\frac{dy}{dx}\right)^3 + 9y = \sin x$ की कोटि है

- (A) 3
- (B) 4
- (C) 2
- (D) इनमें से नोर्न जर्म

21.
$$X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow X^8 =$$

- (A) $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$
- (B) $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
- (C) $\begin{bmatrix} 8 & 0 \end{bmatrix}$
- (D) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

22. $x \in R$, $\tan^{-1} x + \cot^{-1} x =$


- (A) π
- (B) $\frac{\pi}{2}$
- (C) $\frac{2\pi}{3}$
- (D) $\frac{3\pi}{4}$

23. cosec-1 2 का मुख्य मान है

- (A) $\frac{-\pi}{6}$
- (B) $\frac{\pi}{3}$
- (C) $\frac{\pi}{6}$
- (D) इनमें से कोई नहीं

बिहार बोर्ड के नए और पुराने ऑफिसियल क्वेश्रन पेपर, मॉडल पेपर, आंसर-की, पाठ्यक्रम, नोट्स, मॉक टेस्ट, सेंट-अप और प्रैक्टिकल परीक्षा प्रश्न पत्र आदि के लिए...

BiharboardQuestionpaper.com



24. $a \circ b = a^3 + b^3$ प्रकार से परिभाषित N में एक द्विआधारी संक्रिया 'o' में निम्नलिखित में कौन सत्य है?

- (A) संक्रिया साहचर्य और क्रम विनिमेय है
- (B) संक्रिया क्रम विनिमेय है किन्तु साहचर्य नहीं है
- (C) संक्रिया साहचर्य है किन्तु क्रम विनिमेय नहीं है
- (D) इनमें से 😽 🔐

25. समुच्चय में कुल कितने भिन्न संबंध परिभाषित किए जा सकते हैं?

- (A) 2^9
- (B) 2^3
- (C)9
- (D) इनमें से कोई नहीं

D) 衰ᠳ。 $26. \int_{1}^{4} \sqrt{x} \, dx =$ $(4) \frac{14}{3}$ 27. यदि तल ax + by + cz + d = 0 के समांतर रेखा $\frac{x-2}{3} = \frac{y-3}{4} = \frac{z-5}{6}$ हो तो Oper com

- (A) 2a + 3b + 5c = 0
- (B) 3a + 4b + 5c = 0
- (C) 3a + 4b + 6c = 0
- (D) इनमें से कोई नहीं

28. यदि रेखा $\frac{x-2}{a} = \frac{y-3}{b} = \frac{z-4}{c}$ रेखा $\frac{x}{4} = \frac{y}{2} = \frac{z}{3}$ के समांतर हो तो

- (A) 4a + 2b + 3c = 0
- (B) 4a = 2b = 3c
- (C) $\frac{a}{4} = \frac{b}{2} = \frac{c}{3}$
- (D) इनमें से कोई नहीं

- (A) 0
- (B) 112
- (C) 126
- (D) 192
- 30. $\tan^{-1}\frac{1}{7} + \tan^{-1}\frac{1}{13} =$
- (A) $\tan^{-1} \frac{1}{9}$
- (B) $\tan^{-1} \frac{2}{9}$
- (C) $\tan^{-1} \frac{20}{91}$
- (D) $\tan^{-1} \frac{2}{91}$

$$31. \int_{-\pi}^{\pi} \tan x dx =$$

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) -1

32.
$$\int_{-\pi/4}^{\pi/4} \sin^3 x dx =$$

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) $\frac{3}{\sqrt{2}}$

$$33. \int \frac{dx}{e^x + e^{-x}} =$$

(A)
$$tan^{-1} (e^{x}) + k$$

(B)
$$tan^{-1} (e^{-x}) + k$$

(C)
$$\log |e^x + e^{-x}| + k$$

(D)
$$x + k$$

34.
$$\int (4e^{3x} + 1)dx =$$
(A)
$$4e^{3x} + k$$
(B)
$$4/3 e^{3x} + x + k$$
(C)
$$12e^{3x} + x + k$$
(D)
$$12e^{3x} + k$$
35.
$$3\int \sqrt{x} dx =$$
(A)
$$2x^{3/2} + k$$
(B)
$$4x^3 + k$$
(C)
$$3x^{3/2} + k$$
(D)
$$6x^{3/2} + k$$
36.
$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} =$$

(A)
$$4e^{3x} + k$$

(B)
$$4/3 e^{3x} + x+k$$

(C)
$$12e^{3x} + x+k$$

(D)
$$12e^{3x} + k$$

35.
$$3\int \sqrt{x} dx =$$

(A)
$$2x^{3/2} + k$$

(B)
$$4x^3 + k$$

(C)
$$3x^{3/2} + k$$

(D)
$$6x^{3/2} + k$$

$$36. \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} =$$

(C)
$$\cos^{-1} x+k$$

(D)
$$sec^{-1} x+k$$

37. $2 \int \frac{1}{1+4x^2} dx =$

- (A) $tan^{-1} x + k$
- (B) $\log |1+4x^2| + k$
- (C) $tan^{-1} 2x + k$
- (D) $\sin^{-1} 2x + k$

38. $\int \left(\frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos x}\right) a.$ (A) $k + \csc x$ (B) $k - \sin x$ $x + \sin x$

40. $\frac{d}{dx}(a^x) =$

- (A) a^x
- (B) $\frac{a^x}{\log a}$
- (C) a^x.log a
- (D) x log a

- 41. $2\tan^{-1} \frac{1}{2} =$
- (A) $\tan^{-1} \frac{3}{4}$
- (B) $\tan^{-1} \frac{4}{3}$
- (C) $\tan^{-1} \frac{7}{12}$
- (D) $\tan^{-1} \frac{12}{7}$
- 42. दो घटनाएँ A और B स्वतंत्र हैं यदि
- (A) P(AUB) = P(A).P(B)
- (B) P(AUB) = $\frac{P(A)}{P(B)}$
- (C) $P(A \cap B) = P(A).P(B)$
- (D) $P(A \cap B) = \frac{P(A)}{P(B)}$
- 43. यदि $P(A) = \frac{1}{2}$, P(B) = 0 तो P(A/B) = 0
- (A) 0
- (B) $\frac{1}{2}$
- (C) अपरिभाषित
- (D) इनमें से कोई नहीं
- 44. $\begin{bmatrix} 7 & 6 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} =$
- (A) $\begin{bmatrix} 8 & 6 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
- (B) $\begin{bmatrix} 7 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$
- (C) $\begin{bmatrix} 7 & 6 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$
- (D) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

JOODO COM

45. यदि घटनाएँ A और B स्वतंत्र हों तथा $P(A) = \frac{1}{2}, P(A \cup B) = \frac{3}{5}$ तथा P(B)= p तो p का मान है

- (A) 5
- (B) $\frac{1}{5}$
- (C) $\frac{1}{13}$
- (D) इनमें से कोई नहीं
- 46. $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ [5 6] =
- (A) [5 6]
- (B) $\begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix}$
- (C) $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$
- (D) $\begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

46.
$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$
 [5 6] =

(A) [5 6]

(B) $\begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix}$

(C) $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$

(D) $\begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

47. [x y] = [2x - 1 7] \Rightarrow

(A) x = 3, y = 7

(B) x = 1, y = 7

(C) x = 0, y = 7

(D) x = 3, y = 4

- (A) x = 3, y = 7
- (B) x = 1, y = 7
- (C) x = 0, y = 7
- (D) x = 3, y = 4

48. यदि एक वर्ग आव्यूह A इस प्रकार है कि $3A^3 + 2A^2 + 5A + I = 0$ तो A^{-1} बराबर हे

- (A) $3A^2 + 2A + 5I$
- (B) $-3A^2 2A 5I$
- (C) $-3A^2 + 2A 5I$
- (D) इनमें से न्रोर्ट नहीं

- 49. $\int_0^1 x(1-x)^{10} dx =$
- (A) $\frac{1}{132}$
- (B) $\frac{5}{132}$
- (C) $\frac{7}{132}$
-) $\frac{7}{132}$ D) $\frac{45}{244}$ 50. यदि $x = \frac{1}{5}$ (A) $\frac{1}{5}$ $-\frac{1}{5}$

 - 52. $\int \sin x \, dx =$
 - (A) $k = \cos x$
 - (B) $k = \cos x$
 - (C) tan x + k
 - (D) tan x k

53. ∫cos@6θdθ

- (A) $k + \sin 6\theta$
- (B) k sin 6θ
- (C) k 6sin 6θ
- (D) $k + \frac{1}{6}\sin 6\theta$
- 4. $\int \tan 2x dx =$ (A) $\frac{1}{2} \log |\tan 2x| + k$ (B) $\frac{1}{2} \log |\sec 2x| + k$ (C) $2 \log |\sec 2x| + k$ $|\sec x| + k$

55.
$$\int_0^1 x^2 dx =$$

56.
$$\int_0^{\pi/2} \sin x dx =$$

- (A) 0
- (B) 1
- (C) -1
- (D) 2

- $57. \int_a^b e^x dx =$
- (A) $\frac{b}{a}e^x$
- (B) e^{b-a}
- (C) e^b e^a

-) $e^{b} \cdot D$) $e^{b} + e^{a}$ 58. $\int_{a}^{b} dx = C$ (A) b a b + a60. $\int \frac{x^2-1}{x-1} dx =$
 - (A) x + k
 - (B) $\frac{x^2}{2} + x + k$
 - (C) $\frac{x^3}{3} \frac{x^2}{2} + k$
 - (D) $\frac{x^2}{2} + 2x + k$

- 61. $\frac{d}{dx}(e^{13}x) =$
- (A) e^{13x}
- (B) $\frac{1}{13}e^{13x}$
- (C) $13e^{13x}$
-) 13c D) -13e^{13x} $62. \frac{d}{dx} \left(\sin \frac{x}{5} \right) =$ (A) $\cos \frac{x}{5}$ $-\frac{1}{5} \cos \frac{x}{5}$ x

 - $64. \ \frac{d}{dx} \left(\tan \frac{x}{3} \right) =$
 - (A) $\sec^2 \frac{x}{3}$
 - (B) $\frac{1}{3} \sec^2 \frac{x}{3}$
 - (C) $3 \sec^2 \frac{x}{3}$
 - (D) $3.\cot \frac{x}{3}$

- 65. $\frac{d}{dx}\left(\frac{x^4}{4}\right) =$
- (A) $4x^3$
- (B) $x^3 / 4$
- (C) x^3
-) x^{-} D) $16x^{3}$ 66. $\frac{d}{dx} (\log x^{4}) = (A) \frac{4}{x}$ 1.

 - 68. $\frac{d}{d\theta}(\cos^3\theta) =$
 - (A) $3\sin^3 \theta$
 - (B) $3\sin^3\theta\cos\theta$
 - (C) $3\cos^2 \theta \sin \theta$
 - (D) $3\cos^2 \theta \sin \theta$

- $69. \ \frac{d}{dx}(\tan^2 x) =$
- (A) $sec^2 x$
- (B) 2tan x
- (C) 2 tan xsec² x

-) .

 D) 2 tan λ .

 70. $\int x^{3/2} dx =$ (A) $\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + k$ $\frac{5}{2}x^{\frac{5}{2}} + k$

 - 72. अवकल समीकरण $\frac{dy}{dx} + y = 1, y \neq 1$ का हल है
 - (A) $y = 1 + Ae^{-x}$
 - (B) $y = Ae^x$
 - (C) $y = Ae^{2x}$
 - (D) $y = 1 + Ae^{3x}$

73. अवकल समीकरण $\frac{dy}{dx} + 2y = \cos x$ का समाकलन गुणक है

- (A) e^{2x}
- (B) e^{-2x}
- (C) e^{cos}x

ひ) 等可ず。74. 5 プ× 4 で = (4) 20 75. मूल बिन्दु से तल 2x - 3y + 4z = 6 की दूरी है

- (A) $\frac{6}{\sqrt{35}}$
- (B) $\frac{6}{\sqrt{37}}$
- (C) $\frac{6}{\sqrt{29}}$
- (D) $\frac{6}{\sqrt{31}}$

3000 CON 76. तलों 2x + y - 2z = 5 तथा 3x - 6y - 2z = 7 के बीच का कोण है

- (A) $\frac{\pi}{2}$
- (B) $\frac{\pi}{4}$
- (C) $\cos^{-1}\left(\frac{4}{21}\right)$
- (D) $\cos^{-1}\left(\frac{16}{21}\right)$

77. 2, -1, -2 दिक अनुपात वाले रेखा की दिक कोज्याएँ हैं

- (A) $\frac{2}{3}$, $-\frac{1}{3}$, $-\frac{2}{3}$

(A)
$$\frac{2}{3}$$
, $-\frac{1}{3}$, $-\frac{2}{3}$
(B) $\frac{2}{\sqrt{14}}$, $\frac{-1}{\sqrt{14}}$, $-\frac{-2}{\sqrt{14}}$
(C) $\frac{2}{5}$, $\frac{-1}{5}$, $\frac{-2}{5}$
(D) इनमें से कोई नहीं
78. $(\vec{t} - 2\vec{j} + 5\vec{k})$, $(-2\vec{i} + 4\vec{j} + 2\vec{k}) =$
(A) 0
(B) 2
(C) -4
(D) 6
79. $\int xe^{2x}dx =$
(A) $(2x - 1)\frac{e^{2x}}{4} + k$
(B) $(x - 1)\frac{e^{2x}}{4} + k$
(C) $\frac{e^{2x}}{4} + k$
(D) $\frac{(x+2)e^{2x}}{4} + k$

79.
$$\int xe^{2x} dx =$$

(A)
$$(2x-1)\frac{e^{2x}}{4}+k$$

(B)
$$(x-1)\frac{e^{2x}}{4} + k$$

(C)
$$\frac{e^{2x}}{4} + k$$

(D)
$$\frac{(x+2)e^{2x}}{4} + k$$

80.
$$(2\vec{\imath} - 3\vec{\jmath} + 5\vec{k}).(2\vec{\imath} + 2\vec{\jmath} + 2\vec{k}) =$$

- (A) 8
- (B) 2
- (C) 4
- (D) 20

- 81. $\begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 8 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 50 \end{bmatrix} =$
- (A) [260 540]
- (B) $\begin{bmatrix} 260 \\ 540 \end{bmatrix}$
- (C) $\begin{bmatrix} 10 & 25 \\ 400 & 500 \end{bmatrix}$
-) $\left[\frac{35}{900}\right]$ 82. $\left[\frac{2}{6} \quad \frac{-3}{0} \quad \frac{5}{4}\right] = \frac{1}{1} = \frac{1}{$

 - (D) $\begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$
 - 84. यदि $x = a \cos\theta$, $y = a \sin\theta$ तो $\frac{dy}{dx}$ बराबर है
 - (A) $tan\theta$
 - (B) $-\cot\theta$
 - (C) $-tan\theta$
 - (D) $sec^2\theta$

85. यदि x = at², y = 2at तो $\frac{dy}{dx}$ बराबर है

- (A) t
- (B) 1/t
- (C) t^2
- (D) इनमें से कोई नहीं

 $86. \ \frac{d^2}{dx^2}(x^2 + 3x + 2) =$

- (A) 4
- (B) 4x
- (C) 2x + 3
- (D) 2

87. $\frac{d}{dx} [\cos^{-1}(\sin x)] =$

- (A) -1
- (B) $\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$
- (C) $\frac{\sin x}{\sqrt{1-x^2}}$
- (D) $\frac{\pi}{2} x$

88. निम्नलिखित में कौन उद्देशीय फलन है ?

- (A) z = 5x + 7y
- (B) x > 0
- (C) y > 0
- (D) इनमें से कोई नहीं

बिहार बोर्ड के नए और पुराने ऑफिसियल क्वेश्रन पेपर, मॉडल पेंपर, आंसर-की, पाठ्यक्रम, नोट्स, मॉक टेस्ट, सेंट-अप और प्रैक्टिकल परीक्षा प्रश्न पत्र आदि के लिए...



89. व्यवरोधों $x + y \le 7, \ x \ge 0, \ y \ge 0$ के अंतर्गत $11x+2y$ का न्यूनतम मान है
(A) 77
(B) 14
(C) 0
(D) -14

90. व्यवरोधों $3x + 5y \le 30, \ x \ge 0, \ y \ge 0$ के अंतर्गत x + y का अधिकतम मान

- (A) 16
- (B) 10
- (C) 6
- (D) इनमें से कोई नहीं

91. यदि किसी सीधी रेखा की दिक् कोज्याएँ $\frac{3}{\sqrt{77}}, \frac{-2}{\sqrt{77}}, x$ हैं, तो x का मान है OO COM

(A)
$$\frac{6}{\sqrt{77}}$$

(B)
$$\frac{8}{\sqrt{77}}$$

(C)
$$\frac{9}{\sqrt{77}}$$

(D)
$$\frac{1}{\sqrt{77}}$$

92.
$$(\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}) \cdot (\vec{i} - \vec{j} - \vec{k}) \times (\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}) =$$

- (A) 0
- (B) 2
- (C) 4
- (D) 6

93. तल 3x + 4y + 5z - 6 = 0 पर अभिलम्ब के दिक् अन्पात हैं।

- (A) 3, 4, 5
- (B) 3, 4, 5
- (C) 3, -4, 5
- (D) 2, 3, -4

94. निम्नलिखित में कौन तल, तल x = 0 के समांतर है? JOHOO OHOO

- (A) x = -5
- (B) y = 0
- (C) z = 5
- (D) इनमें से कोई नहीं

95. तल 2x - 3y + 4z = 7 के समांतर एक तल का समीकरण है

- (A) 2x 3y 4z = 7
- (B) 2x 3y + 4z = 11
- (C) 2x + 4y 3z = 11
- (D) इनमें से कोई नहीं

Jodo Com 96. तल 4x + 3y - z + 1 = 0 पर लम्ब तल का समीकरण है

- (A) x 5y 11z + 7 = 0
- (B) x y z = 2
- (C) 3x 11y + 92 = 1
- (D) इनमें से कोई नहीं

- 97. $\begin{vmatrix} 2 & 5 & 7 \\ 6 & -8 & -2 \\ 3 & 5 & 8 \end{vmatrix} =$
- (A) 0
- (B) 1
- (C) -13
-) -13 D) 23 98. $\begin{vmatrix} 4 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & -2 \\ 5 & 7 & -2 \end{vmatrix} =$ (A) 0

 - 100. $2\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} =$
 - (A) $\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$
 - (B) $\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 6 & 4 \end{bmatrix}$
 - (C) $\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 6 & 4 \end{bmatrix}$
 - (D) $\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \end{bmatrix}$

खंड-ब (विषयनिष्ठ प्रश्न) लघ् उत्तरीय प्रश्न

- 1. दो रेखाओं के बीच का न्यूनकोण ज्ञात करे जिनके दिक अनुपात (1, 1, 2) और $(\sqrt{3}-1,\sqrt{3}-1,4)$ हैं।
- 2. k का मान ज्ञात करे जिससे सरल रेखाएँ $\frac{x-1}{-1} = \frac{y+3}{k} = \frac{z-7}{2} \text{ तथा } \frac{x+1}{k} = \frac{y}{2} = \frac{z+6}{-3} \text{ परस्पर लम्ब हों।}$

3. यदि
$$\vec{a} = -4\vec{j} + 7\vec{j} - 11\vec{k}$$
 तथा $\vec{b} = 10\vec{j} + \vec{j} + \vec{k}$ तो $\vec{a} \times \vec{b}$ ज्ञात करें ।

4. यदि
$$y = \sin^{-1}\left(\frac{2x}{1+x^2}\right)$$
 तो $\frac{dy}{dx}$ ज्ञात करें।

5. यदि
$$y = \log(x^2\sqrt{x^2 + 1})$$
 तो $\frac{dy}{dx}$ ज्ञात करें।

- 6. यदि x = a cost + b sint, y = a sint + b cost तो $\frac{dy}{dx}$ ज्ञात करें।
- 7. दो पासों को एक साथ फेंका जाता है। अंकों का योगफल 9 या 10 आने की प्रायिकता ज्ञात करे।

8. मान ज्ञात करे :
$$\int_a^b \frac{(\log x)^2}{x} dx$$

- 9. हल करे।
- 10. समाकल

11. $\int_0^{\pi/2} \sin^4 \theta d\theta$ का मान ज्ञात करे।

12.
$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sqrt{\sin x}}{\sqrt{\cos x + \sqrt{\sin x}}} dx$$
 का मान ज्ञात करे।

13. मान ज्ञात करे :
$$(2\vec{i} - 3\vec{j} + 4\vec{k}) \cdot (7\vec{i} + 8\vec{j} - 9\vec{k}) \times (9\vec{i} + 5\vec{j} - 5\vec{k})$$

15. यदि दो घटनाओं A और B के लिए, P(A) = 0.8, P(B) = 0.5 तथा P (B / A) = 0.4 हो तो P(A ∪ B) ज्ञात करें।

16. एक सिक्के को 4 बार उछाला जाता है। ठीक तीन बार शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात करें।

17. निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल करे -

$$x \ge 0, y \ge 0$$

Sport Co. के अंतर्गत z + 2x + 3y का अधिकतम मान ज्ञात करे।

18. r = 8cm त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या ज्ञात r के सापेक्ष ज्ञात करें ।

19. सिद्ध करे कि
$$2 \tan^{-1} \frac{1}{3} + \tan^{-1} \frac{1}{7} = \frac{\pi}{4}$$
.

20. यदि
$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ x & y \\ x^2 & y^2 \end{bmatrix}$$
 तो AA' और A'A.

22. दो बिन्दुओं (-2, 4, -5) और (1, 2, 3) को मिलाने वाली रेखा की दिक-कोसाइन ज्ञात करे।

23. समाकलन करे :
$$\int \sqrt{1 + \cos 2x \ dx}$$

24. समाकलन करे :
$$\int \frac{\sin x + \cos x}{\sqrt{1 + \sin 2x}} dx$$
.

25. x के किन मानों के लिए फलन $y = x^2 - 5x + 3$ का मान ह्रासमान है?

26. हल करे :
$$y - x \frac{dy}{dx} = 2 \left(y^2 + \frac{dy}{dx} \right)$$

27. हल करे :
$$\frac{dy}{dx} + 2y \tan x = \sin x$$

28. यदि
$$y = (\sin x)^{\log x}$$
 तो $\frac{dy}{dx}$ ज्ञात करे।

29. समाकलन करे :
$$\int \frac{x-2}{x^2-3x+2} dx$$

30. समाकलन करे :
$$\int \frac{(\sin x - \cos x)^3}{\sqrt{1 - \sin 3x}} dx$$
.

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न- संख्या 31 से 38 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित है |

31. मान ज्ञात करे :
$$\begin{vmatrix} a^2+1 & ab & ac \\ ab & b^2+1 & bc \\ ac & bc & c^2+1 \end{vmatrix}$$

32. सिद्ध करे कि
$$\tan^{-1}\frac{2}{5} + \tan^{-1}\frac{1}{3} + \tan^{-1}\frac{1}{12} = \frac{\pi}{4}$$

33. यदि (x + y) =
$$\sec^{-1}(x - y)$$
 तो $\frac{dy}{dx}$ ज्ञात करे।

34. न्यूनतमीकरण करे z = 2x + y जबकि x + y ≥ 1

$$x + 2y \le 10$$

$$y \le 4$$

$$x \ge 0, y \ge 0$$

35. हल करे :
$$x \cos\left(\frac{y}{x}\right) (y dx + x dy) = y (x dy - y dx) \sin\left(\frac{y}{x}\right)$$

36. रेखाओं
$$\vec{r}=(\vec{\iota}+2\vec{\jmath}+\vec{k})+\lambda(\vec{\iota}-2\vec{\jmath}+\vec{k})$$

तथा $\vec{r}=(2\vec{\iota}-2\vec{\jmath}-\vec{k})+\mu(\vec{\iota}+\vec{\jmath}+2\vec{k})$ के बीच की लघुतम दूरी ज्ञात करे।

- 37. तीन सिक्कों की उछल में पृष्ठ की संख्या का माध्य ज्ञात करें |
- 38. मान ज्ञात करे : $\int_0^{\pi/2} \log \sin x \ dx$

बिहार बोर्ड के नए और पुराने <mark>ऑफिसियल</mark> क्वेश्रन पेपर, मॉडल पेपर, आंसर-की, पाठ्यक्रम, नोट्स, मॉक टेस्ट, सेंट-अप और प्रैक्टिकल परीक्षा प्रश्न पत्र आदि के लिए...

BiharboardQuestionpaper.com

